



Hygiendirektiv

Schema – desinfektion - städning

För att uppnå maximal effekt vid städning och desinfektion är det den mekaniskbearbetningen av yttersta vikt					
Smittämne	Punktdesinfektion vid spill	Städning		Efter avslutad infektion och vid flyttstädning**	
		Golv	Övriga ytor*	Golv	Övriga ytor*
Blodburen smitta t.ex. Hepatit B, Hepatit C och HIV	Stänk: Ytdesinfektion – alkoholbaserad Större mängd: Virkon 1 % alt. Klorin 1:20	Sedvanlig metod	Sedvanlig metod	Sedvanlig metod	Sedvanlig metod
Influensa Säsongsinfluensa och Nya influensa A H1N1	Stänk: Ytdesinfektion – alkoholbaserad Större mängd: Virkon 1 % alt. Klorin 1:20	Sedvanlig metod	Ytdesinfektion – alkoholbaserad minst 1 ggr/dag	Sedvanlig metod	Ytdesinfektion - alkoholbaserad
Multiresistenta bakterier ESBL, VRE, MRSA	Ytdesinfektion – alkoholbaserad	Sedvanlig metod MRSA: Rengöringsmedel och vatten (<i>inte gemensam dammsugare</i>)	Ytdesinfektion - alkoholbaserad	Sedvanlig metod MRSA: Rengöringsmedel och vatten (<i>inte gemensam dammsugare</i>)	Sedvanlig metod efterföljs av Ytdesinfektion – alkoholbaserad
Tarmsmitta t.ex. Virusdiarré, Clostridium difficile Oklar diarré	Stänk: Ytdesinfektion – alkoholbaserad Större mängd: Virkon 1 % (till Cl. diff Klorin 1 del till 9 delar vatten.)	Sedvanlig metod	Ytdesinfektion - alkoholbaserad	Cl. diff Klorin 1 del till 9 till badrum/toa golv. Övrig smitta sedvanlig metod	Virkon 1% eller Klorin 1:10 (Till Cl. diff Klorin 1 del till 9 delar vatten.)
Tuberkulos Öppen smittsam (extremt ovanligt)	Ytdesinfektion – alkoholbaserad	Sedvanlig metod	Ytdesinfektion - alkoholbaserad	Sedvanlig metod	Sedvanlig metod efterföljs av Ytdesinfektion – alkoholbaserad

* **Med övriga ytor avses:** Kontaktytor, dörrkarmar, dörrhandtag, toalettstol (även toastolsförhöjning), handfat plus kranar, dusch, plana ytor, hjälpmedel, säng, sängbord, larmknapp, nedhängande armatur med mera.

** Om brukaren initialt vårdats i dubblett eller liknande ska säng/sängbord/golv runt brukarens plats städas enligt ”efter avslutad infektion OBS! Eftertorka med vatten vid användning av Klorin och Virkon.

Framtagen av: Vårdhygien i Region Östergötland	Fastställd år: 2009, 2014-01-01	Giltig fr.o.m. 2016-03-07
Fastställd av: Medicinskt ansvariga	Diarienummer: VON 2016/00227	Giltigt t.o.m. 2018-01-01